



Richtlijnen voor de patiënt

Voor de ingreep:

- Voor de ingreep is het 10 dagen lang verboden om aspirine of ontstekingsremmers in te nemen.
- Het is aangeraden om tijdens de 3 dagen voor de ingreep 3 x 2 tabletten per dag "Traumeel" in te nemen, om onderhuidse bloedingen te verminderen. "Traumeel" moet op een nuchtere maag worden ingenomen. Te verkrijgen in de apotheek zonder voorschrift.
- Op de dag van de ingreep is het aangeraden om **geen make-up of nagellak te dragen en geen dagcrème te gebruiken**.
- Op de dag van de ingreep is het aangeraden om geen contactlenzen te dragen.
- Op de dag van de ingreep is het aangeraden om geen juwelen te dragen.
- Op de ochtend van de ingreep moet er thuis gedoucht worden met antiseptische zeep type Hibiscrub, Uni-Cura of Beta-dermyl (verkrijgbaar bij de apotheek).

Na de ingreep:

- Na de ingreep is het 24 uur lang verboden een auto te besturen indien u relaxerende medicatie kreeg.
- De pleister die net na de ingreep wordt aangebracht mag de volgende dag reeds worden verwijderd.

Lipcorrectie

- Tijdens de 7 dagen na de ingreep is het aangeraden elk uur 2 tabletten "Traumeel" in te nemen, om onderhuidse bloedingen te verminderen.
- Als u pijn voelt is het aangeraden om Dafalgan (paracetamol) in te nemen a rato van 1 tablet van 1g, 4 maal per dag, afwisselend met Ibuprofen 600 mg of 400 mg, 2 maal per dag. Als de pijn hevig wordt kunnen andere pijnstillers worden voorgeschreven.
- U krijgt antibiotica voorgeschreven die 2x/dag ingenomen moeten worden tot de doos op is.
- Om het oedeem en de bloedingen te verminderen moeten koude kompressen worden aangebracht op de mond, waarbij rechtstreeks contact tussen de huid en het ijs vermeden moet worden.
- Na de ingreep is het aangeraden om 4 weken lang niet te sporten.

VRAAG ?

webinfo@becclinic.com

+32 2 309 6000