

## LIFTING DES BRAS

### Pourquoi?

Avec l'âge ou après une perte de poids conséquente, un excès de peau peut apparaître sur le corps. Le lifting des bras permet de remédier au relâchement cutané en éliminant l'excès de peau dans cette zone.

#### **L'intervention**

Le lifting des bras se fait sous anesthésie locale et dure environ deux heures.

Le lifting des bras consiste à retirer l'excès de peau, en particulier sur la partie interne du bras. Le lifting des bras peut être combiné avec une liposculpture pour éliminer les accumulations de tissu graisseux.

#### Résultat et traitement post-opératoire

Juste après l'intervention, le chirurgien pose un pansement sur le bras.

Ce sparadrap est retiré en même temps que les points de suture deux semaines après le lifting du bras. En enlevant l'excès de peau sur la face interne du bras, la cicatrice reste très discrète, de l'aisselle au coude.

# **Consignes pour le Patient**

## **Avant l'intervention:**

- Si l'intervention se déroule sous anesthésie locale, il est interdit de boire ou de fumer de l'alcool et il est recommandé de prendre des repas légers.
- Ne prenez pas d'aspirine (ou tout autre médicament contenant de l'acide acétylsalicylique)
  10 jours avant l'intervention.
- Il est recommandé de prendre des compléments alimentaires de type "Nutrimonium" pendant le mois précédant l'intervention.
- Le jour de l'intervention, il est recommandé de ne pas se maquiller, de ne pas porter de lentilles de contact et de ne pas porter de bijoux/pierres.
- Le jour de l'intervention, il est recommandé de porter des vêtements amples et confortables.
- Le matin de l'intervention, le corps doit être lavé avec un savon antiseptique de type Hibiscrub, Uni-Cura ou Betadermyl (disponible en pharmacie).

NOUVEAU: L'oxygénothérapie hyperbare avant et après une intervention chirurgicale. L'OHB aide à la cicatrisation des plaies. Cette thérapie permet d'améliorer/accélérer le processus de cicatrisation. Coût : 180€ pour 2 séances.



#### Après l'intervention:

- Il est interdit de conduire une voiture pendant les 24 heures qui suivent l'intervention.
- Si vous portez un corset compressif après l'opération, vous devez le porter pendant 8 semaines. Vous pouvez le laver à la main.
- Il est recommandé de prendre du Dafalgan 1g (paracétamol) à raison de 1 comprimé de 1g, 4 fois par jour, en alternance avec de l'Ibuprofène 600 mg, 3 fois par jour, et éventuellement de l'Oxynorm instant 5 mg, 2 fois par jour. La prise de ce dernier médicament doit toutefois être interrompue en cas de vomissements.
- Un programme personnalisé contre la douleur vous sera remis le jour de l'intervention.
- On vous prescrira des antibiotiques à prendre 2 fois par jour.
- Il est recommandé de prendre des compléments alimentaires "Nutrimonium" pendant le mois qui suit l'intervention pour accélérer le processus de cicatrisation.
- Un œdème apparaît après l'intervention, qui disparaît spontanément.
- Les points de suture sont retirés après 14 jours, par votre médecin traitant ou à la Be Clinic.
- Une fois les points de suture retirés, le médecin placera des bandes étoilées et un sparadrap imperméable, qui sera retiré après 5 jours. Les cicatrices peuvent être massées avec du Cicalfate (Avène).
- Une fois les plaies refermées, un pansement de type Bapscarcare peut être appliqué pour accélérer la cicatrisation. Il est important de les protéger du soleil pendant au moins un an.
- Après l'intervention, il est recommandé de ne pas porter d'objets lourds et d'éviter le sport pendant 4 semaines.
- Après l'intervention, vous recevrez une lettre post-opératoire personnalisée. Il est très important de suivre les consignes qui y figurent. Celles-ci peuvent différer des consignes générales.

Nous souhaitons vous revoir pour tous les soins postopératoires à la BeClinic.

Un contrôle médical est recommandé après 72 heures, 14 jours, et entre 8 à 10 semaines après l'intervention.

Vous pouvez prendre rendez-vous pour vos consultations de suivi auprès de notre secrétariat.

Pour toute question complémentaire, vous pouvez envoyer un e-mail à webinfo@beclinic.com ou contacter nos secrétaires par téléphone au +32 2 309 90 00 ou via notre numéro WhatsApp gratuit : +32 (0)477 322 000.

