

Liposculpture

Consignes au patient

Consignes au patient

Avant l'intervention :

- 6 heures avant l'intervention, il est interdit de manger, de boire ou de fumer.
- Il est interdit de prendre de l'aspirine (ou tout autre médicament contenant de l'acide acétyl salicylique) pendant les 10 jours qui précèdent l'intervention ;
- Il est conseillé de prendre des compléments alimentaires « Nutrimum » pendant le mois qui précède l'intervention.
- Le jour de l'opération, il est conseillé de ne pas porter de maquillage, ni de vernis à ongles.
- Le jour de l'opération, il est conseillé de ne pas porter de lentilles de contact.
- Le jour de l'opération, il est conseillé de ne pas porter de bijoux, ni de piercing.
- Le jour de l'opération, il est conseillé de porter des vêtements amples et confortables.
- Le matin avant l'intervention, le corps doit être lavé avec un savon antiseptique de type Hibiscrub, Uni-Cura ou Betadermyl (en pharmacie).
- Il est obligatoire de porter des bas de contention le jour de votre intervention. Veuillez acheter la version longue jusqu'au-dessus des genoux. Vous pouvez vous les procurer dans votre pharmacie ou à la clinique (30€).
- **Un test sanguin préopératoire est demandé pour cette procédure.**
Veuillez nous faire parvenir les résultats au moins 10 jours avant votre opération.

NOUVEAU : L'oxygénothérapie hyperbare avant et après une intervention chirurgicale. L'OHB aide à la cicatrisation des plaies. Cette thérapie permet d'améliorer/accélérer le processus de cicatrisation. Coût : 190€ pour 2 séances.

Après l'intervention

- Il est interdit de conduire pendant les 24 heures qui suivent l'opération.
- Les premières 24 heures il est tout à fait normal que vous perdez du liquide par les incisions. On vous conseille de protéger votre lit.
- Après l'intervention, un vêtement de compression doit être porté durant 8 semaines, jour et nuit. Ces collants doivent être remplacés par une taille inférieure tous les 14 jours en fonction de la réduction du gonflement. Veuillez retrouver le schéma et la liste des fournisseurs plus bas dans ce document.
- Il est interdit de prendre une douche le jour de l'intervention ; le vêtement de compression peut être enlevé à partir du lendemain, le temps d'une douche rapide ; les bains sont interdits durant 6 semaines.
- Les points de suture pourront être retirés après 8 à 10 jours. De préférence ici à la Beclinic.
- Il est vivement conseillé de suivre un régime strict pendant au minimum 4 semaines après l'opération afin d'en maximiser les effets.

- Il est conseillé de prendre des compléments alimentaires « Nutrimum » pendant le mois qui suit l'intervention, de façon à accélérer le processus de guérison.
- Un œdème important apparaît après l'opération, qui disparaîtra spontanément. Il est conseillé de prendre du « Lymphomyosot » durant un mois, à raison de 3 x 3 comprimés/jour pendant une semaine, de 3 x 2 comprimés/jour pendant deux semaines et de 3 x 1 comprimé/jour pendant une semaine; ceci augmentera le drainage et permettra d'accélérer la réduction de l'œdème.
- Lors de votre sortie, vous recevrez un schéma qui reprendra la prise des médicaments post-opératoires (anti-douleurs ainsi que antibiotiques).
- A partir du 7-ième jour post-opératoire, nous conseillons de faire des séances de drainage lymphatique (ou séance d'endermologie) de 2 fois par semaine. Vous pouvez également réserver ces séances chez nous auprès de notre secrétariat.
- Il est recommandé de ne pas porter d'objets lourds et de ne pas pratiquer de sport pendant les 4 semaines qui suivent l'intervention (excepté du vélo et de la marche).

Nous souhaitons vous revoir pour tous les soins postopératoires à la BeClinic.

Un contrôle médical est recommandé après 72 heures, 14 jours, et entre 8 à 10 semaines après l'intervention.

Vous pouvez prendre rendez-vous pour vos consultations de suivi auprès de notre secrétariat.

Pour toute question complémentaire, vous pouvez envoyer un e-mail à webinfo@beclinic.com ou contacter nos secrétaires par téléphone au +32 2 309 90 00 ou via notre numéro WhatsApp gratuit : +32 (0)477 322 000.

Après l'intervention, un lettre post-opératoire vous sera procurée contenant des consignes spécifiques. Il sera très important de bien suivre ces consignes spécifiques car elle peuvent être différentes des consignes générales.

Un 2-ième panty peut également être acheté à la BeClinic.

Collants post-opératoires : informations et adresses de vente.

Après l'opération, des collants de compression doivent être portés jour et nuit pendant 8 semaines. Ces collants doivent être remplacés par une taille inférieure tous les 14 jours en fonction de la diminution du gonflement.

Nous aimons garder cet horaire :

JOUR 1-10 : Mise en place des collants après la chirurgie

JOUR 11-21 : Collants 1 taille en dessous ou selon le tableau des tailles.

JOUR 21 - semaine 6/8 : nouveaux collants selon le tableau des tailles

Vous pouvez acheter ces collants chez BeClinic ou en ligne.

Une liste de fournisseurs peut être obtenue auprès du secrétariat.

Nous n'envoyons pas de collants à domicile en raison des frais d'expédition trop élevés.

Nous pouvons par contre vous aviser les site ou magasins suivants.

Lipoelastic: www.lipoelastic.com www.lipoelastic.co.uk Modèles recommandés après une liposculpture à 360° : Variante VF Body Variante du corps VD si les cuisses sont également traitées. Nous avons créé un code que vous pouvez donner à vos patients, leur permettant de bénéficier d'une réduction de 10 % sur une commande, hors frais de port supplémentaires. Le code est : beclinic	QueenY dolls empire: www.queenydollsempire.nl Chez QueenYDollsEmpire, nous vendons des marques colombiennes bien connues de fajas postopératoires de stade 1, 2 et 3, que l'on peut porter après une intervention esthétique telle qu'une liposuction, un BBL, une abdominoplastie ou une chirurgie mammaire, ainsi qu'une vaste collection de produits postopératoires. Modèles recommandés après une liposculpture avec BBL : Melibelt 2019 Melibelt 3026 MariaE RA001 : ces collants sont dotés d'une armature pour un effet sablier supplémentaire. Maria FQ111 : (jambes courtes, dos haut) pour une compression supplémentaire au niveau de l'abdomen/des flancs/du dos. Maria OLFA 101 : (jambes au-dessus du genou) pour une compression supplémentaire au niveau du ventre, des flancs et du dos. Nous avons créé un code que vous pouvez donner à vos patients, leur permettant de bénéficier d'une réduction de 10 % sur une commande, hors frais de port supplémentaires. Le code est : beclinic22
---	---