

AUGMENTATION DES FESSES PAR IMPLANTS

Consignes pour le patient

Avant l'intervention:

- À partir de 6 heures avant l'intervention, il est interdit de manger, de boire ou de fumer.
- La prise d'aspirine (ou de tout autre médicament contenant de l'acide acétylsalicylique) est interdite pendant les 10 jours précédant l'intervention.
- Le jour de l'intervention, il est recommandé de ne pas se maquiller.
- Le jour de l'intervention, il est recommandé de ne pas porter de lentilles de contact.
- Le jour de l'intervention, il est recommandé de ne pas porter de bijoux/piercings.
- Le jour de l'intervention, il est recommandé de porter des vêtements amples et confortables.
- Le matin de l'intervention, le corps doit être lavé avec un savon antiseptique de type Hibiscrub, Uni-Cura ou Betadermyl (disponible en pharmacie).

NOUVEAU : L'oxygénothérapie hyperbare avant et après une intervention chirurgicale. L'OHB aide à la cicatrisation des plaies. Cette thérapie permet d'améliorer/accélérer le processus de cicatrisation. Coût : 180€ pour 2 séances.

Après l'intervention:

- Après l'intervention, il est interdit de conduire une voiture pendant 24 heures.
- Après l'intervention, un panty de compression doit être porté jour et nuit pendant 8 semaines. Ce panty peut être enlevé brièvement après 48 heures pour une douche rapide ; les bains sont interdits durant 12 semaines. Vous pouvez laver le panty à la main.
- Pendant les 6 semaines suivant l'intervention, il faut éviter toute pression sur les fesses : il est donc recommandé de ne pas dormir sur le dos, de ne pas conduire de voiture, de ne pas se pencher ni soulever d'objets. En position assise, il est recommandé de se tenir droit, le dos légèrement creusé.
- Il est recommandé de prendre du Dafalgan (paracétamol) à raison de 1 comprimé de 1g, 4 fois par jour, en alternance avec de l'Ibuprofène 600 mg, 3 fois par jour, et éventuellement de l'Oxynorm 5mg 2 fois par jour. Toutefois, la prise de ce dernier médicament doit être interrompue en cas de vomissements.
- En fonction de l'intervention, vous recevrez un programme de traitement de la douleur modifié !
- On vous prescrira des antibiotiques à prendre 2x/jour jusqu'à épuisement de la boîte.
- Il est recommandé de porter une attention particulière à l'hygiène de la zone affectée pendant les semaines qui suivent l'intervention.
- Un œdème apparaît après l'intervention, qui disparaît spontanément.
- Les points de suture sont retirés après 14 jours, soit par votre médecin traitant, soit à la Be Clinic.
- Après l'intervention, il est conseillé de ne pas porter d'objets lourds et de ne pas faire de sport pendant 6 semaines.
- Nous souhaitons vous revoir pour tous les soins postopératoires à la BeClinic.
Un contrôle médical est recommandé après 72 heures, 14 jours, et entre 8 à 10 semaines après l'intervention.
Vous pouvez prendre rendez-vous pour vos consultations de suivi auprès de notre secrétariat.
Pour toute question complémentaire, vous pouvez envoyer un e-mail à webinfo@beclinic.com ou contacter nos secrétaires par téléphone au +32 2 309 90 00 ou via notre numéro WhatsApp gratuit : +32 (0)477 322 000.

Après l'opération, vous recevrez une lettre postopératoire personnalisée. Il est très important de suivre les directives qui y figurent. Celles-ci peuvent différer des directives générales.